

Relação das plantas usadas para avaliação da época de floração

Relação das espécies em ordem alfabética, seguidas dos autores que citam suas épocas de floração e/ou as exsicatas que foram usadas neste trabalho para avaliação do período de floração. Herbários: Herbarium Bradeanum (HB); Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB); Instituto Agronômico de Minas Gerais (BHMG); Instituto de Botânica de São Paulo (SP); Universidade de Brasília (UB).

Acalypha brevipes — R99680 — /XI.

A. clausenii — RB130751 — 31/IX; UB10661 — 3/XI; UB29581 — 8/X.

Acalypha indeterminada, coletada em cerrado — UB26456 — 22/IX; UB36542 — 13/X; UB 5465 — 25/XI.

Floração de *Acalypha*: setembro a novembro.

Alchornea triplinervia — SP75892 — 9/XI; UB10583 — /XI. var. *genuina* — SP31237 — XII.

var. *janeirensis* — SP28585 — 16/XII.

Floração de *Alchornea*: novembro a dezembro.

Alternanthera regelii — SP64033 — II/IV; SP66349 — 10/I.

Anacardium humile — UB45616 — II/VII; UB12113 — II/IX; SP65786 — /VIII.

A. nanum — UB14648 — 18/VIII; UB14929 — 30/VIII; UB24857 — 23/IX; UB12113 — 11/IX.

A. occidentale, coletado em cerrado — UB20469 — 28/IX.

Anacardium indeterminado, mas coletado em cerrado — UB14466 — 13/VIII; UB28589 — 27/VII; UB5779 — 15/X; UB4831 — 15/X.

Floração de *Anacardium*: julho a outubro.

Andira cuyabensis — Malme (1924) — dezembro, janeiro.

Andira humilis — SP74813 — 22/IX; Rizzo (1970) — setembro.

A. laurifolia — BHMG18248 — 4/IX.

A. vermiculata — SP65066 — 14/XI; Malme (1924) — setembro, outubro.

Floração de *Andira*: setembro a janeiro.

Antonia ovata — SP53145 — 12/VIII; Malme (1924) — julho, agosto.

Aspilia foliacea — SP43347 — 4/XII.

A. reflexa — BHMG44766 — 23/XI.

A. setosa — SP53162 — -/I; Rizzo (1970) — novembro, dezembro.
Aspilia, gênero — Warming (1909) — novembro a janeiro.
Floração de *Aspilia*: novembro a janeiro.

Baccharis heterophylla — SP58966 — -/VII.
B. rufescens — BHMG27243 — -/VII.
Baccharis, gênero — Warming (1909) — maio a julho.
Floração de *Baccharis* — maio a julho.

Bidens gardneri — SP3563 — 24/II; RB114867 — SP64064 — 28/III; SP20432 — 21/V.
B. graveolens — RB104056 — 16/III.
B. segetum — SP52550 — 12/IV — (determinada como sendo *Bidens rubifolia* Kunth.)
Floração de *Bidens*: fevereiro a maio.
Borreria capitata — UB 28306 — 11/VI
Borreria poaya — Rizzo (1970) — dezembro.
Borreria valerianoides — SP64074 — 28/III; Rizzo (1970) — março e abril.

Brosimum gaudichaudii — UB32896 — 19/VIII; UB11315 — 28/VIII; UB20880 — 9/VIII;
UB26404 — 22/IX; UB45688 — 15/IX; SP36876 — 18/XI.
Floração: agosto a novembro.

Cabralea polytricha — SP54805 — 11/IX.
Calea clauseniana — RB113522 — 8/X.
C. platylepis — BHMG35327 — 21/XI.
Casearia grandiflora — SP68422 — 17/III.
Cassia basifolia — SP38008 — 3/V; SP74809 — -/X (Eiten 2770).
C. cathartica — BHMG22541 — 19/VI; SP74945 — 9/V; SP76787 — -/XII (Eiten 3559); Rizzo
(1970) — maio, junho.
C. cotinifolia — RB28731 — -/V.
[] var. *glaberrima* — SP36380 — 10/IX.
C. flexuosa — BHMG2014 — 8/XI.
C. hispidula — SP38027 — 31/III.
C. langsdorffii — RB98301 — 15/III; RB103393 — -/XI.
C. orbiculata — RB70247 — -/V; Rizzo (1970) — junho, julho.
C. pilifera — BHMG41386 — 22/II; RB110334 — -/VII.
C. riparia var. *pilosa* — SP38066 — 13/I; RB65595 — -/II.
C. rotundifolia — SP48364 — 2/III; RB94429 — -/XI.
C. rugosa — SP74946 — 9/V; SP74329 — -/VI; SP64071 — RB114890 — 28/III; Rizzo (1970)
— março.
C. tecta — RB6110 — 7/VII; RB6055 — /VIII.
C. trichopoda — SP651 — 15/III.
Floração de *Cassia*: o ano inteiro, dependendo da espécie.

Cecropia — várias espécies, em mata ciliar, nos limites com os cerrados do Brasil Central;
UB18528 — 29/I; UB21683 — 18/I; UB21679 — 29/I;
UB21661 — 28/I; UB27138 — 19/I; UB34977 — 21/I;
UB35510 — 6/IV; UB31563 — 13/V; UB29269 — 23/VI;
UB10389 — 10/VI; UB42557 — 17/VII; UB18834 — 26/VIII;
UB21761 — 17/VIII; UB4090 — 23/IX; UB27620 — 20/X;
UB21766 — 23/X.

Floração: janeiro; abril a outubro.

Cienfuegosia phlomidifolia — SP12201 — -/IV.

Cordia chamissonis — Warming (1909) — maio e julho.

Cupania paniculata — Glaziou — Flora Brasil. XII. III p. 576 n.º 12501 — 4/VII.

Fremantthus glomeratus — Loefgren (1890) — setembro e dezembro; Rizzo (1970) — maio.

Eremanthus — seg. Warming (1909); várias espécies florescem de maio a julho.
Eriope crassipes — SP58974 — 13/IX — Rizzo (1970) — agosto e novembro.

Erythroxylum campestre — seg. Warming (1909) — duas floradas: fevereiro; julho a setembro —

E. cuneifolium — BHMG17837 — 23/VIII

E. paradoxum — BHMG8896 — 3/IX

E. suberosum — Rizzo (1970) — novembro — BHMG42313 — 22/X

E. tortuosum — seg. Warming (1909), duas floradas: agosto, setembro; dezembro a fevereiro.

Floração de *Erythroxylum*: julho a fevereiro.

Euplassa, espécies da mata ciliar, capoeira ou mata, nos limites de cerrados — UB146 — abril; UB20046 — agosto; UB 16292 — setembro; UB16512, UB20452, UB20203 — outubro; UB32897 — novembro; UB9487 — dezembro.

Floração: abril; agosto a dezembro.

Froeichia interrupta — SP66132 — 10/I; SP11048 — 22/XI.

Gomphrena macrocephala — SP6187 — 28/VIII; SP64036 — 11/IV.

G. lanigera — Rizzo (1970) — julho.

G. officinalis — Warming (1909) — novembro a janeiro; SP40413 — 20/I; SP77448 — 19/III.

G. pohlii — SP66118 — 8/II.

G. prostrata — SP84764 — -/I; SP11097 — 12/I; SP65082 — 14/IX;

G. riedelli — SP39436 — 15/III.

G. scapigera — BHMG7964 — 5/VII.

G. virgata — SP43223 — 25/IX.

Floração de *Gomphrena* — julho a abril.

Hirtella americana — SP2194 — -/III.

Hiptis cana — SP1305 — 8/VII.

H. crinita — SP46042 — 19/VII.

H. eryphylla — SP53395 — 28/II; SP32885 — -/III.

H. taxiflora — BHMG42221 — 2/VIII.

H. macrosiphon — SP82731 — 22/V; SP32897 — -/III.

H. molissima — BHMG5053 — 13/IV.

H. virgata — SP7937 — 28/IX.

Floração de *Hiptis*: fevereiro a setembro.

Ichthyothere latifolia — RB110456 — 27/XII; Rizzo (1970) — outubro e novembro.

I. rufa — RB96522 — 17/X.

Ipomoea angustifolia — BHMG3060 — 27/I.

Ipomoea decumbens — BHMG3053 — 27/I.

Ipomoea villosa — RB100194 — 17/III; BHMG14573 — 12/III; Rizzo (1970) — fevereiro.

I. procurrens — BHMG14558 — 19/IV.

I. virgata — Dept. Botânica USP — 19/XII (1949).

Floração de *Ipomoea*: setembro, dezembro a abril.

Isostigma peucedanifolium — SP64185 — 27/XII.

I. speciosum — RB65743 — 14/II.

Jacaranda decurrens — Rizzo (1970) — agosto e outubro.

Jacaranda semiserrata — RB73327 — 29/XI.

Maprounea brasiliensis — RB111988 — -/VIII — para esta espécie Warming (1909) dá duas floradas — de junho a agosto e de janeiro a fevereiro.

Memora axilaris — SP77552 — -/II.

M. campicola — UB40665 — 24/V.

M. globerrima — UB45231 — 19/XI; UB7938 — 19/IV.

M. nodosa — UB18977 — 14/VII; UB5943 — 3/VI.

M. pedunculata — UB46057 — 13/V; UB651 — 16/IV.

M. pubescens — UB5944 — 3/VI.

Floração de *Memora*: abril a setembro.

Ouratea crassifolia — SP65457 — 5/IX.

O. cuspidata — SP24717 — -/X.

O. floribunda — SP32089 — 1/X; Rizzo (1970) — julho e setembro.

O. spectabilis — SP77441 — 17/VI.

O. riedeliana — Warming (1909) dá duas floradas de maio a setembro, e em dezembro.

Floração de *Ouratea*: maio a setembro, dezembro.

Palicourea rigida — UB27053 — 22/IX; UB27081 — 16/IX; UB23657 — 16/X; UB18839 — 17/X; UB9247 — 5/X; UB14455 — 31/X; UB15396 — 14/XI. UB35768 — 26/XI; UB27689 — 30/XI. UB9737 — 10/XII; UB17167 — 16/XII; UB17111 — 23/XII; UB43774 — 26/1; UB28807 — 14/1; UB36279 — 3/11.

Rizzo (1970) — setembro, outubro e novembro.

P. squarosa — UB26924 — 11/IX; UB9439 — 10/X; UB40410 — 10/XI; UB44918 — 23/II; UB45336 — 9/III; UB9272 — 16/III.

P. xanthophylla — UB23665 — 29/IX; UB27703 — 30/XI; UB40409 — 10/XII; UB21849 — -/XII; UB28805 — 19/I; UB28803 — 22/I; UB21620 — 5/III; UB36149 — 6/III; UB7424 — 10/III.

Floração de *Palicourea*: setembro a maio.

Pfaffia gnaphaloides — SP99444 — -/I; SP43210 — -/IX.

P. jubata — SP36321 — 10/IX; SP84733 — -/IX. Rizzo (1970) — agosto, setembro.

P. sericea — SP78569 — 21/IV; SP84713 — -/XII.

P. velutina — BHMG34295 — 20/IX; RB44046 — -/IX.

Floração de *Pfaffia*: agosto-setembro; dezembro, janeiro (abril).

Pavonia speciosa ssp. *genuina* — BHMG2954 — 14/I.

P. speciosa ssp. *polymorpha* — BHMG2548 — 28/XII.

P. speciosa ssp. *stenochlamys* — BHMG24244 — 2/XI.

Floração de *Pavonia*: novembro a janeiro.

Pisonea noxia — segundo Warming, duas floradas: setembro-outubro. e dezembro-janeiro; R33975 — 18/X.

Plathymenia reticulata — SP56492 — 20/XI.

Poiretia latifolia — SP13300 — 17/I.

Pseudobombax campestre — Robyns (1963) — maio.

P. longiflorum — Robyns (1963) — (maio) junho, julho (agosto); Malme (1924) (*B. elegans*) — junho-julho.

P. marginatum — Robyns (1963) — dezembro e agosto, mais freqüente de dezembro a fevereiro.

P. tomentosum — fevereiro a agosto (Robyns 1963).

P. argentinum — dezembro a julho.

Floração de *Pseudobombax*: dezembro a agosto.

Qualea brevipetiolata — Malme (1924) — abril a maio.

Q. glauca — setembro-outubro (Malme 1924).

Q. grandiflora — dezembro a fevereiro (Malme 1924); dezembro, janeiro e março (Rizzo 1970).

Q. parviflora — dezembro e fevereiro (Malme 1924); janeiro.

(Warming 1909); abril a maio, agosto a novembro (Rizzo 1970)

Floração de *Qualea*: agosto a maio.

Rapanea umbellata — SP237 — 22/VI; SP84531 — 16/VII; SP29760 — A — 4/VII.

Floração: junho a julho.

Rabdotocaulon denudatus — SP8317 — 29/IV.

Riencourtia oblongifolia — SP16699 — 10/II; Rizzo (1970) — abril.

Roupala, várias espécies dos cerrados — junho-julho (Warming 1909).

Rourea inducta — Dept. Botânica USP, 10/XII/1948 (col. A. B. Jolly).

Salacia campestris — agosto a outubro — Loefgren (1890).

Salvia scabrida — SP58796 — 24/III.

S. tomentella — SP32887 — -/XI.

Schwenckia americana — var. *angustifolia* HB45975 — 25/XI; HB31215 — 15/III.

Sclerolobium aureum — RB43664 — 18/XII; SP55592 — 3/II; SP75024 — -/IV; Malme (1924) — dezembro-janeiro.

S. paniculatum — RB2658 — -/XI; Malme (1924) setembro e novembro.

Floração de *Sclerolobium*: setembro a abril.

Sebastiania corniculata — UB38799 — 16/III.

var. *lacta* + UB10704 — 18/XII; UB9580 — 18/I.

S. glandulosa — SP54792 — -/II; Rizzo (1970) — janeiro, fevereiro.

S. serrulata — UB26885 — 11/IX; UB31505 — 12/XII; UB18204 — 9/I; UB18127 — 9/I; UB38776 — 16/I; UB29738 — 18/I; UB29104 — 2/II; UB22991 — 8/III; UB799 — 21/IV; UB32746 — 2/VI; UB16261 — 3/VI.

var. *glabescens* — SP31435 — 22/XI.

var. *oblongifolia* — UB41734 — 16/XI; BHMG30015 — 3/XII; UB41046 — 23/XII.

var. *oncoblepharin* — UB41700 — 9/XII; UB41051 — 30/XII.

S. virgata — UB25849 — 29/III; UB5473 — 28/IV.

var. *odontocacca* — UB9579 — 6/I; BHMG3485 — 31/I.

Floração de *Sebastiania*: outubro a junho.

Smilax cissoides — SP36398 — 9/IX; UB3743 — 4/IX.

S. irrorata — SP74820 — 31/VIII.

S. syringoides — SP12472 — 13/X.

S. undulata — SP74066 — 28/I.

Smilax, indeterminado, mas coletado em cerrado — UB7742 — 12/V; UB6447 — 3/VI; UB15888 — 21/VII; UB26908 — 28/VIII; UB11414 — 28/VIII; UB7727 — 7/IX; UB20053 — 12/IX; UB10042 — 20/IX; UM27245 — 29/IX; UB1717 — 29/IX; UB1722 — 10/X; UB30651 — 13/X; UB30852 — 29/X; UB10889 — 8/XII.

Floração de *Smilax*: abril a outubro; dezembro.

Spilanthes urens — RB66258 — 12/XI.

Stryphnodendron adstringens — UB27350 — 25/VIII; UB11478 — 20/IX; UB27350 — 25/X; UB27593 — 25/X; Malme (1924) — setembro, outubro; Rizzo (1970) — setembro.

S. confertum — UB32984 — 10/IX; UB114475 — 20/IX.

S. obovatum — Malme (1924) — novembro e dezembro.

S. platyspicum — UB20049 — 12/IX; UB26625 — 6/IX; UB11476 — 20/IX; UB27237 — 24/IX; UB12843 — 28/X.

S. polyphyllum — UB6694 — 31/XI; UB8524 — 15/II.

Floração de *Stryphnodendron*: agosto a fevereiro.

Tephrosia adunca — SP36389 — 6/IX.

T. rufescens — SP24508 — 29/XI.

Terminalia argentea — SP55588 — 13/IX, Warming (1909) — agosto-setembro.

T. fagifolia — Warming (1909) agosto-setembro.

Floração de *Terminalia*: agosto a setembro.

Viguiera arenaria - SP3654 - 26/II.

V. robusta - SP46797 - 4/V; Rizzo (1970) - abril.

Waltheria americana - Warming (1909) - período longo de floração, quase o ano todo.

Wedelia macrodonta - SP16797 - 29/XI.

W. puberula - SP16809 - 13/XII.

Zeyhera montana - UB25341 - 18/I; UB34634 - 25/I; UB26959 - 13/II; UB7927 - 1/III;
UB643 - 13/IV; UB3803 - 6/V; UB 18605 - 22/VI; UB 7946 - 10/VIII (+ frutos);

UB7594 - 24/VIII (+ frutos); UB45642 - 15/X, Loefgren (1890) setembro e novembro;

Floração de *Zeyhera*: o ano todo, com exceção talvez de dezembro.

Zornia brasiliensis - BHMG112870 - -/IV.

Zornia diphylla, coletada em cerrado - UB9735 - 27/I; UB9923 - 28/II; UB26945 - 13/III;
UB28833 - 2/III.

Z. virgata - UB25293 - 25/III.

Floração de *Zornia*: janeiro a abril.